



teva

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

ACICLOVIR®

CREMA DERMICA 5%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

ACICLOVIR CREMA DERMICA 5%
Cada gramo contiene: Aciclovir 50 mg Excipientes: Vaselina líquida, alcohol cetosteárico, metilparabeno, propilparabeno, polioxil-20-cetileter, agua purificada, vaselina sólida.

Clasificación: Antiviral

Indicación: "Tratamiento de infecciones mucocutáneas por Herpes simplex tipo I y II (labial y genital)"

2.- Administración (tópico)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda: Esquema posológico: "La aplicación para el tratamiento de infecciones mucocutáneas de Herpes simplex tipo I y II (labial y genital), es cinco veces al día a intervalos de aproximadamente cuatro horas, omitiendo la aplicación nocturna. La dosis o cantidad de crema deberá ser indicada por su médico tratante.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Se debe continuar el tratamiento durante 5 días. Si no se ha producido la curación en 5 días, el tratamiento puede prolongarse 5 días más hasta un total de 10 días. En caso de que los síntomas empeoren o no se observe mejoría en los 10 días de tratamiento, deberá reevaluarse la situación clínica.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo sobre la zona afectada en cuanto sienta los primeros síntomas de aparición del herpes. No debe ser diluido o ser usado como base para agregar otro medicamento debido a la especialidad de su formulación. No debe ser aplicado en los ojos.

- Uso prolongado

Debe aplicar sobre la zona afectada sólo hasta que la piel recupere su aspecto normal, siguiendo las indicaciones de su médico.

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

- **Qué necesita saber antes de empezar a usar aciclovir crema**

No use Aciclovir crema

- si es alérgico al aciclovir, valaciclovir o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Si piensa que esto le afecta, no use Aciclovir crema hasta que lo consulte con su médico.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento.

Antes de usar Aciclovir crema, su médico necesita saber:

- si las recaídas son frecuentes, si tiene una afección en la que su sistema inmune funcione peor o su cuerpo sea menos capaz de combatir las infecciones (por ejemplo, si padece una infección por VIH o SIDA o si ha recibido un trasplante de médula).

Consulte con su médico si piensa que esto le afecta, para que decida si debe cambiar a una presentación de administración oral. No se recomienda la aplicación de aciclovir en mucosas como en caso de la boca, los ojos o la vagina ya que puede ser irritante. Se debe tener especial cuidado para evitar la introducción accidental en los ojos. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar con un oftalmólogo si fuese necesario.



teva

El herpes genital puede transmitirse por contacto sexual, incluso si la pareja no presenta síntomas. Debe evitarse el contacto sexual si un miembro de la pareja presenta signos o síntomas de herpes genital. Aciclovir no evita la transmisión del herpes.

No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

Niños y adolescentes

La administración en niños debe realizarse siempre bajo supervisión médica.

Uso de Aciclovir crema con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo

Su médico valorará el beneficio para usted y el riesgo para su bebé de usar Aciclovir crema durante el embarazo.

Lactancia

Su médico valorará el beneficio para usted y el riesgo para su bebé de usar Aciclovir crema durante la lactancia. Consulte con su médico antes de usar Aciclovir crema. Los datos limitados en humanos muestran que el fármaco pasa a la leche materna después de la administración sistémica. Sin embargo, la dosis recibida por un lactante después del uso materno de crema de aciclovir sería insignificante.

Conducción y uso de máquinas

La influencia para conducir o usar máquinas es nula o insignificante.

Aciclovir crema contiene alcohol cetosteárico.

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárico.

No utilizar este medicamento en bebés menores de 4 semanas con heridas abiertas o grandes áreas de piel dañada (como quemaduras) sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si usa más Aciclovir crema del que debe

Si usa más Aciclovir Crema del que debe, retire el exceso cuidadosamente. No es probable que se produzcan cuadros de sobredosis con este medicamento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame a un centro asistencial

Si olvidó usar Aciclovir crema

En caso de olvidar una aplicación, realícela lo antes posible, sin embargo, si es cercana a la hora de su próxima aplicación, omita la aplicación olvidada.

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente continúe con el tratamiento habitual tan pronto como sea posible.

No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

No interrumpa el tratamiento con Aciclovir crema sin consultar con su médico.

Es importante que use Aciclovir crema durante el tiempo indicado para eliminar completamente la infección.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación
- leve sequedad o descamación de la piel
- sensación de picor, prurito.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):

- enrojecimiento de la piel
- erupción de la piel, dermatitis de contacto.

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):

- Reacciones de hipersensibilidad inmediata (reacciones alérgicas).

Los signos de hipersensibilidad pueden incluir:

- hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo (angioedema)
- erupción, picor o urticaria en la piel
- falta de aliento, dificultad respiratoria o sibilancias
- fiebre inexplicable y sensación de desmayo, particularmente estando de pie.



teva

Contacte con un médico inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas y deje de usar Aciclovir crema de inmediato.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona**

LABORATORIO CHILE S.A.
Santiago - Chile
www.laboratoriochile.cl