



teva

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ALFADOXIN® 4mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.**

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:  
ALFADOXIN 4 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Cada comprimido recubierto contiene:**  
Doxazosina (como mesilato) 4 mg

**Excipientes:** Celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, colorante FD&C rojo N° 40 lacado, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, poliacrilatos dispersión, talco, dióxido de titanio, simeticona, colorante FD&C rojo N° 27 lacado, macrogol, hipromelosa.

### **INDICACIONES:**

Tratamiento de hipertensión arterial, como terapia única o asociada a otros agentes antihipertensivos.  
Hipertrofia prostática benigna (para el tratamiento de los síntomas urinarios).

### **CLASIFICACIÓN:**

Antihipertensivo. Agente terapéutico para la hiperplasia prostática benigna.

### **ADVERTENCIAS:**

Use sólo por indicación y bajo supervisión médica.  
Se debe controlar la presión del paciente 2 a 4 horas después de la primera dosis y también a las 24 horas.  
Operadores de equipos, conductores de vehículos y personas que requieran permanecer en estado de alerta, deben ser advertidos de posible somnolencia y mareos.  
Este medicamento contiene colorante rojo FD&C N° 40 como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No usar en: Hipersensibilidad a la Doxazosina y en caso de enfermedad grave del hígado.

### **INTERACCIONES:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con



teva

los siguientes productos: Diuréticos (Hidroclorotiazida, Furosemida y otros), Antihipertensivos (Propranolol, Atenolol, Nifedipino, Nitrendipino, Hidralazina, Prazosina). Simpaticomiméticos (Efedrina, Pseudoefedrina y Dopamina), antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y estrógenos.

#### **REACCIONES ADVERSAS:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Dolor de cabeza, rinitis, somnolencia con las primeras dosis.

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico: Hipotensión ortostática que se manifiesta generalmente con la primera dosis o los sucesivos aumentos de ella; se pueden presentar mareos, vértigos o desmayos al ponerse de pie. También puede aparecer sensación de cansancio, inquietud, náuseas o edema (retención de agua).

#### **PRECAUCIONES:**

Personas sensibles a otros productos relacionados como Prazosina, Terazosina también pueden serlo a este medicamento.

Embarazo y lactancia

No se ha establecido la seguridad de su uso, por lo que no se recomienda en este estado.

Ancianos: El efecto hipotensor es más acentuado por lo que se debe cuidar la dosis.

#### **DOSIS:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no

obstante la dosis usual recomendada es:

Inicio del tratamiento:

Se debe comenzar con dosis de 1 mg de Doxazosina por 2 semanas, luego aumentar la dosis inicial a 2 mg cada día por 2 semanas también, por lo tanto es según la respuesta y tolerancia.

Se recomienda tomar la primera dosis y los incrementos sucesivos al acostarse, para prevenir caídas por hipotensión.

La dosis inicial para adultos, como antihipertensivo es de 1 mg, al acostarse; la dosis de mantención se debe determinar según necesidades; con incrementos cada 14 días a 2, 4 u 8 mg, diarios, según respuesta y tolerancia.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Administración vía oral. Para prevenir la hipotensión ortostática las primeras dosis deben ser las mínimas de acuerdo a lo que le indique su médico, se recomienda tomar los comprimidos al acostarse para prevenir caídas, tomar los comprimidos con un vaso de líquido.

#### **SOBREDOSIS:**

- Síntomas: hipotensión, insuficiencia circulatoria, shock.
- Tratamiento: la insuficiencia circulatoria se debe tratar colocando el enfermo en posición supina con las extremidades levantadas. Si se produce shock, administrar soluciones de expandidores plasmáticos y vasopresores.



teva

- Instaurar tratamiento sintomático y adoptar las medidas de mantenimiento con monitoreo del estado hidro-electrolítico.

**CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener lejos del alcance de los niños, a no más de 30°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

**LABORATORIO CHILE S.A.**  
Santiago – Chile  
[www.laboratoriochile.cl](http://www.laboratoriochile.cl)