



teva

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE BETAMETASONA - NEOMICINA UNGÜENTO DERMICO

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

### COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

BETAMETASONA - NEOMICINA UNGÜENTO DERMICO	
Cada gramo contiene:	
Betametasona (como dipropionato)	0,5 mg
Neomicina (como sulfato)	5,0 mg
Excipientes: Vaselina líquida, vaselina sólida.	

**CLASIFICACION:** Antibiótico y Antiinflamatorio tópico.

**INDICACION:** Inflamación cutánea superficial, reacciones alérgicas de la piel, asociada a riesgo de infección.

### CONTRAINDICACIONES:

No use Betametasona - Neomicina Ungüento:

- en niños menores de 2 años
- en grandes áreas durante un período de tiempo prolongado
- para tratar cualquiera de los siguientes problemas de la piel; estos podrían empeorar:
  - infecciones virales como herpes labial, herpes o varicela
  - infecciones por hongos como tiña, pie de atleta o aftas
  - acné
  - rosácea (una afección de la piel del rostro en la que la nariz, las mejillas, la barbilla, la frente toda la cara están inusualmente rojas, con o sin pequeños vasos sanguíneos visibles, protuberancias (pápulas) o protuberancias llenas de pus (pústulas))
  - erupciones alrededor de la boca
  - picazón en la piel que no está inflamada
  - piel inflamada, roja y escamosa del oído externo y del canal auditivo si el tímpano está perforado
  - picazón alrededor del ano o genitales (pene y vagina).

Si cree que Usted tiene alguna de estas condiciones, no use Betametasona - Neomicina hasta que lo haya consultado con su médico o farmacéutico.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Informe a su médico si es alérgico (hipersensible) a Betametasona - Neomicina o a cualquiera de los ingredientes indicados en la sección inicial de éste folleto.
  - No diluya Betametasona - Neomicina
  - Utilice Betametasona - Neomicina únicamente durante el tiempo que le recomiende su médico. Si su condición no mejora después de 7 días de tratamiento, hable con su médico.
  - Tenga cuidado al aplicar Betametasona - Neomicina en los párpados para asegurarse de que no le entre en el ojo.
  - Tenga cuidado al aplicar Betametasona - Neomicina en el rostro durante un largo período de tiempo, ya que puede causar adelgazamiento de la piel.
  - Si tiene eccema alrededor de una úlcera en la pierna, el uso de un corticosteroide tópico puede aumentar el riesgo de una reacción alérgica o una infección alrededor de la úlcera.
  - Solo use un apósito hermético sobre este medicamento si su médico se lo ha indicado. Si está aplicando Betametasona - Neomicina debajo de un apósito hermético, incluido el pañal de un niño, asegúrese de que la piel esté limpia antes de aplicar un apósito nuevo, para prevenir infecciones.
- Comuníquese de inmediato con su médico si se desarrolla una infección

### Embarazo y lactancia

Si está embarazada, o cree que podría estarlo, o si planea quedar embarazada, no use Betametasona - Neomicina sin antes hablar con su médico.

Si está amamantando, no use Betametasona - Neomicina sin antes hablar con su médico.

Si olvidó usar Betametasona - Neomicina

- aplíquelo tan pronto como lo recuerde y luego continúe como antes.
- No aplique más Betametasona - Neomicina para compensar las dosis olvidadas.

Si usa demasiada Betametasona - Neomicina

Si aplica una gran cantidad de Betametasona - Neomicina o ingiere accidentalmente una gran cantidad, podría enfermarse. Si ingiere una gran cantidad, enjuáguese la boca con abundante agua y consulte a su médico o un centro asistencial.



teva

### **INTERACCIONES:**

Otros medicamentos y Betametasona - Neomicina

Algunos medicamentos pueden afectar el funcionamiento de Betametasona - Neomicina o hacer que sea más probable que tenga efectos secundarios. Ejemplos de estos medicamentos incluyen:

Ritonavir e itraconazol

- Agentes bloqueadores neuromusculares como galamina, mivacurio, pancuronio
- Otros medicamentos que contienen neomicina

Importante: Informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de estos.

Existen otros medicamentos que pueden tener un efecto similar. Por lo tanto, es muy importante que informe a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, si ha tomado alguno recientemente o si comienza a tomar uno nuevo. Esto incluye los medicamentos adquiridos sin receta.

### **EFFECTOS ADVERSOS:**

Al igual que todos los medicamentos, Betametasona - Neomicina puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los efectos secundarios afectarán su piel y pueden afectar otras partes de su cuerpo si una cantidad suficiente de medicamento se absorbe a través de la piel y entra en el torrente sanguíneo.

Si la afección de su piel empeora o su piel se hincha durante el tratamiento, es posible que sea alérgico al medicamento, tenga una infección o necesite otro tratamiento. Deje de usar Betametasona - Neomicina e informe a su médico lo antes posible.

Efectos secundarios comunes (Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- picazón en la piel
- ardor o dolor local de la piel

Efectos secundarios muy raros (Pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

El uso de Betametasona - Neomicina durante un período prolongado, o el uso debajo de un apósito hermético, puede causar los siguientes síntomas:

- aumento de peso
- cara de luna (aumento de tamaño de la cara)
- obesidad
- adelgazamiento de la piel: esto puede causar estrías
- arrugas de la piel
- sequedad de la piel
- la aparición de vasos sanguíneos debajo de la superficie de la piel
- cambios en el color de su piel
- aumento del vello corporal
- Caída del cabello / falta de crecimiento del cabello / cabello con apariencia dañada.

Otras reacciones cutáneas muy raras que pueden ocurrir son:

- reacción alérgica en el lugar de aplicación
- empeoramiento de la condición actual
- irritación en el lugar de aplicación
- enrojecimiento
- sarpullido o urticaria
- Si tiene psoriasis, puede presentar protuberancias con pus debajo de la piel. Esto puede ocurrir muy raramente durante o después del tratamiento y se conoce como psoriasis pustulosa.
- infección en la piel.

Los siguientes efectos secundarios muy raros también pueden ocurrir en niños:

- aumento de peso retrasado
- crecimiento lento.

Efectos secundarios muy raros que pueden aparecer en los análisis de sangre o cuando su médico le realiza un examen médico:

- una disminución del nivel de la hormona cortisol en sangre
- aumento de los niveles de azúcar en sangre u orina
- Alta presión sanguínea
- cristalino nublado en el ojo (cataratas)
- aumento de la presión en el ojo (glaucoma)
- Debilitamiento de los huesos debido a la pérdida gradual de minerales (osteoporosis).

Es posible que se necesiten pruebas adicionales después de su examen médico para confirmar si padece esta afección.

### **DOSIS:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante: Se recomienda aplicar una capa fina sobre el área afectada. Es importante no utilizar más cantidad ni por más tiempo que la prescrita por el médico.



teva

**MODO DE EMPLEO:**

Administrar solamente por vía tópica dérmica.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

LABORATORIO CHILE S.A.  
Santiago – Chile  
[www.laboratoriochile.cl](http://www.laboratoriochile.cl)